

გამოკვეთის სქემა

უნიბროტი
5ლ/100ლ წყალში

კოლაშინ 150
300მლ/100ლ წყალში

კოლაფოლ
მაქსიმუმი 8-11-3
200მლ/100ლ წყალში
ან
გროგრინ გელი
სტარტერი 16-69-16
0.5კგ/100ლ წყალში

კოლაფოლ
მაქსიმუმი 8-11-3
200მლ/100ლ წყალში
ან
გროგრინ გელი
სტარტერი 16-69-16
0.5კგ/100ლ წყალში

კოლაშინ B-Mo
200მლ/100 ლ წყალში
კელპაკი
300მლ/100ლ წყალში

ფრუტმაქსი 10
200მლ/100 ლ წყალში

ფრუტმაქსი 10
200მლ/100 ლ წყალში

კოლაფოლ K35
მაქაჰა
300მლ/100ლ წყალში
ან
გროგრინ გელი
ნაყოფი 18-11-59
0.5კგ/100ლ წყალში
კოლაკალ ბორო
250მლ/100ლ წყალში

კოლაფოლ K35
მაქაჰა
300მლ/100ლ წყალში
ან
გროგრინ გელი
ნაყოფი 18-11-59
0.5კგ/100ლ წყალში
კოლაკალ ბორო
250მლ/100ლ წყალში


კოლაფოლ K35
მაქაჰა
300მლ/100ლ წყალში
ან
გროგრინ გელი
ნაყოფი 18-11-59
0.5კგ/100ლ წყალში
კოლაკალ ბორო
250მლ/100ლ წყალში

ფოთლიდან

ფესვიდან

ევროტიმი მჰჰა ან ევროპაკი მჰჰა 200-300კგ/ჰა

კალასული 70-100კგ/ჰა



ქვირქის დაბერვა	ქვირქის მახსნა	4-5 ფოთლის ფაზა	ყვავილენი კოქრების განსაღ- ქვეების ფაზა	ყვავილობის პერიოდი	ყვავილობის დასაწყისი	ყვავილობის დასასრული	გამოსორბვა	მოზარდი მარცვალი	ისპრინობის პერიოდის დასაწყისი	სრული ისპრინობა	შეთვალვა
--------------------	-------------------	--------------------	---	-----------------------	-------------------------	-------------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	----------

მავნებელ-დაავადებებთან
ბრძოლა

ლიმაი
0.2ლ/ჰა

ტანოსი
0.16კგ/ჰა

კაიზო
0.1კგ/ჰა

ორტუსი
0.15ლ/ჰა

კურზატი
2კგ/ჰა

კოლადექს PG
50მლ/100ლ წყალში

ლიმაი
0.4ლ/ჰა

დიმეკური
0.3ლ/ჰა

ტაზერი
0.5ლ/ჰა

ტალსტარი
0.5ლ/ჰა

კოლადექს PG
50მლ/100ლ წყალში

ზორვეკ ვინაბული
0.5ლ/ჰა

ტალენდო
0.25ლ/ჰა

კოლადექს PG
50მლ/100ლ წყალში

ზორვეკ ვინაბული
0.5ლ/ჰა

მისტიკი
0.4ლ/ჰა

კოლადექს PG
50მლ/100ლ წყალში

ლიმაი
0.4ლ/ჰა

დიმეკური
0.3ლ/ჰა

ტალენდო
0.25ლ/ჰა

კოლადექს PG
50მლ/100ლ წყალში

ლიმაი
0.4ლ/ჰა

მისტიკი - 0.4ლ/ჰა
ან
ფობოსი - 0.25ლ/ჰა

ავანტი
0.25ლ/ჰა

კოლადექს PG
50მლ/100ლ წყალში

კურზატი რ
3კგ/ჰა

კოლადექს PG
50მლ/100ლ წყალში

კოსალი 2000 - 3კგ/ჰა
ან
ფუნგურანი - 3კგ/ჰა

კაიზო
0.3კგ/ჰა

კოსალი 2000 - 3კგ/ჰა
ან
ფუნგურანი - 3კგ/ჰა

აფეტი
1.2ლ/ჰა

გაითვალისწინეთ, რომ სქემა ატარებს
სარეკომენდაციო ხასიათს. პესტიციდების და
სასუქების საპექტრო რაოდენობა დამოკიდებულია
მცენარის განვითარების ფაზაზე, ასაკზე და ნიადაგის
ანალიზის შედეგებზე. ზუსტი რჩევების მისაღებად
მიმართეთ კომპანია კარტლის აგროსისტემების
სპეციალისტებს.

ზორვეკ ვინაბელი

Corteva (საფრანგეთი)



ზორვეკი 40 გ/ლ + ზოქსამიდი 300 გ/ლ

პრეპარატი რომელიც ცვლის თამაშის წესებს! ზორვეკ ვინაბელი წარმოადგენს უახლესი თაობის სისტემურ ფუნგიციდს ვაზის ქრავის წინააღმდეგ საბრძოლველად.

- მის შემადგენლობაში შემაჯალი ორი ახალი მოქმედი ნივთიერება უზრუნველყოფს პრეპარატის გამორჩეულად მაღალ ეფექტურობას;
- ზორვეკ ვინაბელი იცავს არა მხოლოდ შესხურების მომენტისთვის არსებულ ფოთლებს, არამედ შესხურების შემდეგ ახალ გამოტანილ ფოთლებსაც კი;
- ახასიათებს ტრანსლამინარული მოქმედება და ეფექტურად გადააწილდება მწვანე მასაში;
- სწრაფად აღწევს მცენარის ცვილისებურ ფენაში და არ ირეცხება წვიმით შესხურებიდან 20 წუთშიც კი, მოხერხებულია გამოყენება არასტაბილურ კლიმატურ პირობებში;
- ორი ახალი ურთიერთშემავსებელი მოქმედი ნივთიერების შემცველობა გამოირიცხავს ჯვარედინ რეზისტენტობას.

ლიმაი

Nissan Chemical (იაპონია)



ამისულბრომი 200 გ/ლ

ლიმაი წარმოადგენს უნიკალური მოქმედების კონტაქტურ ფუნგიციდს.

- დამუშავებისთანავე ნაწილდება როგორც ფოთლის ზედაპირზე, ასევე მის ცვილისებურ ფენაში და წარმოქმნის სოკოს სპორების საწინააღმდეგო, საიმედო, დამცავ ბარიერს;
- განსხვავებით ყველა სხვა კონტაქტური ფუნგიციდებისგან ლიმაის ახასიათებს ფოთოლში ტრანსლამინარული გადაადგილება, შედეგად უზრუნველყოფს მცენარის საიმედო დაცვას როგორც პირველადი, აგრეთვე მეორადი ინფიცირებისგან;
- გააჩნია მაღალი მედეგობა წყლით ჩამორეცხვის მიმართ, დამუშავებიდან 1 საათში მოსული ნალექით არ ირეცხება.

ტალენდო

Corteva (საფრანგეთი)



პროკვინაზიდი 200 გ/ლ

ფუნგიციდი ვაზის ნაცრის წინააღმდეგ

ტალენდო დღეისათვის წარმოადგენს მსოფლიოში ვაზის ნაცრის საწინააღმდეგო საუკეთესო პრეპარატს.

- ტალენდოს გააჩნია უნიკალური ფუმიგატიური ეფექტი: პრეპარატის ორთქლი ადვილად აღწევს მტევნის შიგნით მარცვლებს შორის სივრცეში და ანადგურებს სოკოს სპორებს იქაც კი, სადაც სამუშაო ხსნარი ვერ ზვდება;
- ტალენდოს ტრანსლამინარული თვისება უზრუნველყოფს ვაზისა და ფოთლის დაცვას ორივე მხრიდან.
- ტალენდოთი დამუშავებული მცენარე საიმედოდაა დაცული ინფიცირებისაგან;
- ტალენდოთი დამუშავებულ მცენარეში იზრდება იმ ფერმენტების რაოდენობა, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან მცენარის სოკოვანი ინფექციისაგან ბუნებრივ დაცვაზე.

კოსაიდი ოპტი

Cosaco (აშშ)



სპილენძის ჰიდროქსიდი - 46.1% (30% მეტალური სპილენძის ექვივალენტი)

ინოვაციური პროდუქტი მსოფლიო ბაზარზე, ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიით შემუშავებული სპილენძის ფუნგიციდი/ბაქტერიციდი.

- კოსაიდი ოპტი არის ინოვაციური პროდუქტი, რომელსაც ახასიათებს მაღალი იონიზაციის ხარისხი, შედეგად წყალხსნარში წარმოქმნის სპილენძის იონებს უფრო მაღალი კონცენტრაციით ვიდრე ნებისმიერი სხვა სპილენძის შემცველი პროდუქტი;
- სწორედ ეს განაპირობებს კოსაიდი ოპტის გამოყენების დაბალ ნორმებს და ძლიერ ბაქტერიციდულ მოქმედებას;
- კოსაიდი ოპტი წარმოადგენს კოსაიდი 2000-ის გაუმჯობესებულ ვარიანტს;
- ფართოდ გამოიყენება ბაქტერიოზების, ბაქტერიული სილაქავის, სიხუჭუჭის, მონილიოზის, ნაცრისფერი სილამპლის და სხვა ბაქტერიული და სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ;
- კოსაიდი ოპტის ანტიბაქტერიული მოქმედების წყალობით, მოსალოდნელი სუსტი ყინვის წინ 24 საათით ადრე დამუშავების შემთხვევაში, კოსაიდი ოპტი მოქმედებს მცენარის ზედაპირზე ყინულის წარმოქმნის ხელშემწყობ ბაქტერიებზე: ფსევდომონაზე და ერვინიაზე. ამ შემთხვევებით კოსაიდი ოპტი მცენარეს იცავს სუსტი წყინვისგან.

ფრუტმაქსი 10

3.46% N + 1.96% K2O + 1.15% B + 0.11% Mo + 11.55% თავისუფალი ამინომჟავები + 9.47% წყალმცენარეების ექსტრაქტი (წ/მ)

- შექმნილია ნაყოფების ჩამოყალიბების ეტაპზე გამოსაყენებლად;
- ხელს უწყობს მცენარის უჯრედების გაყოფის და ზრდის პროცესებს;
- ფრუტმაქსი 10-ის გამოყენება NPK სასუქებთან ერთად, მცენარეს ანიჭებს მეტ ენერგიას, რაც მაქსიმალურად აუმჯობესებს ნაყოფის ზომასა და ფორმას;
- ზრდის საერთო მოსავლიანობას.



უნიბროტი

12.64% N + 3.52% ამინომჟავები + 23.07% CaO (წ/მ)

ბიოსტიმულატორი ამინომჟავების, აზოტისა და კალციუმის შემცველობით, რომელიც ხელს უწყობს ყვავილობის ერთდროულ წარმართვას.

- უნიბროტის მოქმედებით მცირდება განუვითარებელი კვირტების რაოდენობა და იზრდება ნაყოფის გამონასკვის პროცენტი;
- ზდება ნაყოფების ბუნებრივი კალიბრაცია და მიიღება თანაბარი ზომის მქონე ნაყოფები;
- მოსავალი შემოდის 5-10 დღით ადრე;
- პირველი კრეფის დროს იკრიფება 30%-ით მეტი მოსავალი;
- მცირდება ჯამურად ჩასატარებელი კრეფის რაოდენობა.



ვაზის ძირითადი გავნებელ-დაავადებები




ნაცრისფერი სილამპლე



ფომოფისიოზი




ქრავი



ყურძნის ქია



ნაცარი



ტკიპა

თბილისი:

ცენტრალური ოფისი

კოსტავას ქ. №75გ / +995 32 244 55 42

საწყობი

წულუკიძის ქ. №21 / 599 58 92 26

მაღაზია

ავტოსადგური ოკრიბა / 591 34 30 91

რეგიონული სერვის-ცენტრები:

გორი, სოფ. კარალეთი / 511 16 44 50

ქუთაისი, სოფ. ქვიტირი / 598 80 87 08

ზუგდიდი, სანაპიროს ქ.14 / 591 51 05 66

გურჯაანი, სოფ. გურჯაანი / 595 51 76 30

გურჯაანი, სოფ. ვაჩნაძიანი / 511 13 99 50

ლაგოდეხი, ცოდნისკარი / 599 03 77 06

მარნეული / 599 03 77 10

საგარეჯო / 591 10 00 26

სამტრედია / 599 03 77 14

აფენი, სოფ. ჭაბუკიანი / 599 03 77 06

ზესტაფონი / 591 06 68 15

წნორი / 595 80 55 27

ამბროლაური, ვაჟა ფშაველას 6 / 595 39 84 41

ახალქალაქი / 595 26 55 43

კარტლისი

კარტლისი

www.cartlis.ge
www.fb.com/cartlis

2025